

DEO OPTIMO MAX. UNI ET TRINO.

VIRGINI DEIPARÆ, ET S. LUCÆ,
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA, QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vigesima-tertia Novembris M. DCC. XLI.

M. GEDEONE DE RABOURS,
Doctore Medico, Præfide.

An Pyrifanus scilicet Mercurialibus provocatus, perfellat Luis Venereæ simulationi adversetur?

SUB finem seculi decimi quinti, novus appellatione saltem, in Italiâ coepit morbus fe-
vire, quem Neapolitani Gallicum, Galli Neapolitanum dixere. Infulis Antillis endemium,
hincque à Christophori Columbi, post erectam Hispaniolam, militibus in Europam delatum,
cum maximâ medicorum & historicorum parte, doctissimus contendit Astrucius (a). Adver-
sationum partes augent roborantque multum argumenta Beckeri (b), Angliæ monumenta Co-
lumbi expeditione vultuaria, diligentia scrutati. Hæc gonorrhœam (c); (d) carunculas ure-
thrae, fragiformes (i) alias, alias verrucis similes (f), ulcuscula balani contumacia (g) seu can-
eros; inguinum bubones (h); tibiarum exstolices (i); ozœnam (k); ulcera gutturis (l); vo-
cem raucam (m); pilorum desuvium (n) & casum nasi (o), ut cætera taceam (p), memorant.
In iis therapia exponitur carunculae, catharteticorum & candelarum ceratum usus (q); infe-
ctionis modus à Gilberto circa annum 1360 traditus (r), & nefandi hujusce morbi prophylaxis,
unica castratione (s) speranda, quasi solâ Venere propagaretur. Movenr quidem hæc, (Danie-
leni le Clerc ad assensum (t) cogissent) movent & argumenta clarissimi Astrucii, quem magis-
stram gloriæ venerorque, ut neutrius possim sententia assentiri, donec novum alteruter lanci
sua pondus addiderit (u), vel quæ memorat Beckerus monumenta, ipsissimis liceat meis ocu-
lis inspicere & genuina probare. Cujuscunque ramen fuerit Luis Venereæ, benignum mortali-
bus numen *avideret* dedit assequi, quam medici totidem tentare modis curant, quot ip-
sam adhiberi, alterati, celarive posse crediderunt. Hinc methodorum quæ occurrunt, multiplex
varietas, hinc arcanorum quæ ad sydera tolluntur mira ubertas. Primas tamen, nec immittit
tener unguentum *ὀδονόπικον*, ab Arabibus primò, postea ab aliis benè multis in Europâ medi-
cis, 13^o, 14^o & 15^o seculis, contra pediculos, scabiem, herpetem cæteraque cutis delectatorio-

(a) De Morbis Vener. (b) Vid. Dissertat. tres de antiq. Luis Vener. transact. phil. vol. 5. Hent. Jones. pag. 38r. & seqq. vol. 31. pag. 47 & seqq. & pag. 108. & seqq.

(c) Transact. phil. vol. 31. pag. 51. Arsura qualis nostra est gonorrhœa. *Thesaurum vœ celli à clap.* quam Jo. Arden incendium & excoitationem urethrae dicit, transact. phil. vol. 4. Jones. pag. 381. cui in quibusdam mæde-
tibus anodynus, *ibid.* pag. 384. & asstringentibus transact. phil. vol. 11. pag. 57. posteriora præteritis Gaddisfen
Ros. Angl. arsuram vero illam eandem esse ac gonorrhœam nostram, alterius contendit ex explicati-væ vocis *Bren-
ning*, quam anno 1590. dixerunt *Apegalle*, h. e. ulcus penis cum puris effluxu, vel ulcus manans penis, vel
potius, afflicus penis dolore & materies purulenta effluxu stipatus. vol. 4. pag. 384, ut ipsa vox *Apegalle* innuit.

(f) Transact. phil. v. 31. pag. 50. 51. (g) *Ibid.* (h) *Ibid.* (i) *Ibid.* (k) *Ibid.* pag. 52. Anglicè *Dorseri*, quos
arsura pediculi, vel focos dicit And. Boord Medicus, transact. phil. v. 4. pag. 385.

(l) Anglicè *Quinsore*, transact. phil. v. 31. pag. 51. quibus chirurgi Angliæ isem hodie Londini remedia
medicetur, quæ tunc temporis detecta, in istem casibus usurpabantur.

(m) (n) *Ibid.* pag. 50. (o) *Ibid.* (p) *Ibid.* pag. 62.

(q) Quæ passim in tribus hîc dissertationibus legere est. Vid. Astr. T. 1. cap. 7.

(r) *Ibid.* pag. 51. (s) Qui in leprosa mulieris vaginâ latet humor malignus, coarctus cum ea vii urethram
cubet, inde per venas & arterias in universum corpus traducendus, totius machinæ corruptelam producurus,
ibid. pag. 58.

(t) *Ibid.* pag. 61.

(u) Histoire de la Médecine in-4^o. chez Isaac Vander Kloot en 1799. pag. 790.

(v) Beckeri fato sancti amicus dicitur partes suscepit.

nes adhibuit (v). Idem Carpenſis (w) & coctanei plures (x), cum ſolita incaſſim remedia experti eſſent, mali ſimilitudine moti, in ulum advocare non dubitarunt. Initio pulſulis & ulceribus (y) admoveſci, dein hæc & interſtitia oblenire, ſelectas poſtea (z), & tandem ſingulas gradatim partes inſignere ſub t. Creſcente ſcilicet in dies experimentorum numero, inunctiones cogitatus adminiſtrari (aa), Mercurii vires ſolertius explorari (ab), illius effectus accuratius adverteri (bc), unguentum ſimplicius & fortius conſtitui (c), Hydrargyrum interius præſcribi (dd), novumque quod mor. ex purgationis genus, pro cæciſſimâ Luis Placica med. curâ haberi (ee). Quæ ubique valuit tandiu opinio, dum illuſtriſſimi Franciſci Chironeau (ff), meritiſſimi Archiatrorum comitis, de aſſegandâ ſalvatione, diſſertatio experimentis ſuſcita prodiret (gg). Tentaminibus aniam dedit tencellulorum infantum, invalidorum ſenum, epilepticorum, ſcorbuticorum, quibus interiora oris ulcerata, gingivæque cræſæ fœtebant, aſſictorum ſcrophulis, febri lentâ laborantium, conſumptorum macie, gravidarumque Viru & nervo inquinatorum (bb) tractatio, quam juxta conſuetam methodum, non niſi ſummo abortus, ſalutis, vel vitæ periculo (ii), ſuccellu autem proſperitimo, ſi Pyſſalimus, & alia quælibet notabilis evacuatio vitæcuræ (kk), tum ab aliis petitis medicis, tum à ſe ipſo (ll) celebrati, ſæpius obſervaverat. Plures igitur ætate, ſexu & temperie, viribus, patriâ, moribus, vitæ genere, ſymptomatum numero, diſtinctitate & accrebite diſcrepantes, eo inungi modo curavit, ut nullus ſalivæ fluxus, nulla inſignis excrecio proritaretur (mm). Res votis ſuccedit (nn), quod fuſſit ratio, experien-

(v) Maſſa de m. g. tt. 4. c. 3. 1. e Cleric. vid. pag. 791. Aſt. de m. v. pag. 156. & ſeqq.

(w) Falop. de m. g. c. 76. (x) Cataneus de m. g. c. 7. de Vigo Collect. Luſitan L. B. pag. 453. Aſt. ibid.

(y) Tran ad phil. v. 31. pag. 16. Sebaſt. Aquilan. Jacob. Romer. Pet. Maynard. vid. Aſt. v. 2. Cotad. Gil. Collèd. Luſin. ad calcem opusculi.

(z) Interas tibiarum & brach. plant. ped. palm. vid. Windel. de Hook. cap. de unguent. & de natura argenti vivi.

(aa) Windel de Hook. Joh. Benediçt. Almenar. Bethencourt. Maſſa. Paſchalis. Theodorico de Hery. Botal. Aliique plures, quos vid. apud Doctiſſimum Aſtuc. T. 2.

(ab) (aa) Almenar. cap. 6. Collèd. Luſin. Joh. Widm. Alexander Benediçt. Angelus Bolog. Martiell. Bethencourt apud Aſtuc. Ficaſtor. de ſyphillid.

(c) Angel. Bolog. 1577. unguentum componebat ex laſulo & Mercurio. Geotg. Veliz 1503. magis compoſitum. Maynardus anno 1718. ex axung. cineth. & Mercurio. Vid. Vid. anno 1550. ex adip. ſuſilla, ol. amygdal. & Mercurio Petrus. Fig. 1606. ex axung. & Mercurio. Vigerius anno 1657. ol. vel ugentum. nervinum Adm. . . in unguent. Gilini Mercurius erat $\frac{1}{15}$ totius. Joh. Widman $\frac{1}{4}$ vel $\frac{1}{20}$ Gaſpar. Tortel. $\frac{1}{9}$ Sebaſtian. Aquilan.

$\frac{1}{4}$ de Hook. $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{17}$ vel $\frac{1}{20}$ Joh. Benediçt. $\frac{1}{10}$. Almenar. $\frac{1}{9}$. Angel. Bolog. $\frac{1}{2}$. Vigo. $\frac{1}{16}$ Matin. Bocard. $\frac{1}{16}$.

Fetr. Maynard. $\frac{1}{16}$ Paſchal. $\frac{1}{8}$ Benediçt. Rin. $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ Vid. Vid. $\frac{1}{3}$ Auger. Fetrer. ad robuſtus $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{4}$ ad delicatiora $\frac{1}{2}$ ad infantes infra $\frac{1}{3}$ Botal. $\frac{1}{4}$ vel $\frac{1}{2}$ & ſic deinceps ut hodie apud omnes fit $\frac{1}{3}$. vel $\frac{1}{2}$ Aſt.

v. 2. (dd) Vid. Aſt. L. 11. pag. 161. & ſeqq. L. 5 ad annum 1537.

(ee) Aſtuc in præte. poſt multos alios pag. 9. no. 6.

(ff) Illi (non Medici Monſepſulani ſine illius diſſignatione) Monſepſulana methodo tribuunt in epistolâ anonymâ Londini excuſâ, anno 1738. neque idcirco authori dicendus vel adulatur, vel in rebus medicis novo æſtanti. Non potum, cum dictam epistolam typis non deſtinaverat, & exemplaria quotquot potti, propriis ſumptibus comparaverat, ne ſitis publici fieret, anonyma licet, & Anglico idiomate cœnſa. Non igit, collectionem enim Luſitanam, Lugdun. Batavorum excoſam, anno 1728, decem jam elapſis annis totam perlegi, proindeque illum non latuit ex antiquioribus, plures de evitando Pyſſalim, & intercalanis ſeditionibus nulli ſcripiſſe. Ideoque quamvis methodum Monſepſulanam illis tironendam nullus crediderit, amico talem ſcripiſſe epistolam, unde non potui non intelligere, ab ipſis etiam inventi remedi incun. bulis, viam ad ver. in methodum ſterni cepiſſe, auctam à multis, complantam tandem, abiolutam & ad exoptatum finem perducam eſſe, ab illuſtriſſimo Archiatrorum comite. Sic enim legere eſt pag. 5. » Exord. (Ad Carp. ſuſcit tempore) » unguentum, & inunctionem » mechiſis variis recepte prædictis gradus. Huic extrema Domini Chyconeau manus aſſi poſuit, & mu. » ſtâ mercedi inſeruit, curam Lau. Verre » amem præſtiti plenam, pœnitiæ ex fauore non min. facilem » reddidit. Humanitas, » in ægru poſit » medicis incrementum (quod vœdi ſemper laudat) & ſecutiſſi cui » præter cancellos, gloria eſſetere, ut calcarâ majoribus ſemâ egreſſis, novum quæ ter tæret, quod cum » amicis & diſcipulis cito communicavit. » Quæ equitur octodecim lineæ integre authoris mentem planam, » indubiam ſaiunt, & ſtabilitate receptæque hujus methodi gloriam Domino Chyconeau, ab author delatam pro. » bant. Vid. epistolam medicis medicinam peregrî facientes, ad amicum Londinienſem in quâ probatur tum exem. » plis tum argumentis, in Luc Venetâ, plus nuſu d. ſperandum eſſe, à euatione Monſepſulanâ methodo peratâ, » quant ab eâ, quæ ſit conſuetum methodo ſalvationis.

(gg) Seditiones Mercuriales ad curandam Luem Veneream non ſunt adhibendæ in hunc finem, ut ſalivæ fluxus concitetur. Monſp. 1710.

(hh) Euſt. diſſertat. obſerv. 5. 6. 7.

(i) kk. Id. ibid. conſer. Aſt. pag. 412. & ſeqq.

(ll) Docto forſan exemplo à Jacobo à Bethencourt 1517. qui morbo inveterato unctiões debiliōres & tempus longius præſcribat. Nicol. Maſſâ 1531. qui ægris debilibus admodum, piæganitibus & puerulis unctiões per intervalla præſcribat. Joh. Paſchal. 1531. qui eadem methodo in ægris debilibus, magis conſumptis, & ſenibus ærebus, Aloyſio Lobera 1546. qui inunctionibus per intervalla celebrabat, ſi ægritudo ingens fuerit, & ſecutiſſi de Hery 1551. qui in ægros tantum debilibus vitandum Pyſſalim, & ſeditiones intercalares commendat. Leonard. Botal 1561. qui exemplum aſſert infantis, levioribus inunctionibus ſuſati, Petro de Tortes 1600. qui debilibus 12 quaque die inunctiones præſcribit. Heicul. Saxon. 1557. Sebaſtian. Cortilione 1610. Neque vero hujusmodi eſt hodie medicos exemplum duſſiſſe ab aliis, forſan à Windelluo de Hook 1502. & illius imitatoribus Joh. h. Benediçt. & Joh. Almenar.

(mm) Quod proprium vid. diſſert. ſuperius laudar. obſerv. 8. 9. non Windelluo de Hook, neque illius ſeditione.

ria comprobatur, eventus in nullo Pyralismo casu necessarium esse ostendit (80). Aboluit exinde inivitis repentinum (pp) conaribus salivatio, ut vix iduos Monspellii reperias, qui eâ methodo urantur. Oblolescit etiam nunc hodie Parisiis, neque defunt apud exteras nationes, qui eam rejiciant (99). An iidem cuncti rationibus adducantur, non asseram. Nos sequentes tantum in medium afferemus. Vel in eâ sufficiens Mercurii quantitas sanguini non immiscetur, vel mixtus ubique vasorum non fertur, vel eâ corpore citius eliminatur, quam ut singulis humorum guttulis occurrat.

rum, qui Mercurium improbant, cathartica frigidioribus interponunt, nec Pyralismum conatum evitant, nisi ut feriori oris gingivarum, palati, faucium & linguae inflammationibus, ulceribus, vel suffocationibus occurrant. vid. notam sequent. in eadem classe numerandi sunt Anton. Mus. Brassavolus 1551. Amatus Lusitanus 1556. Guill. Rondenelle 1560. Leonard. Botal. in riacfar. panperum 1563. Julius Palmari. 1578. Joh. Rod. Aratus 1574. Luc. Chin. 1589. Joh. Hartmannus 1611. Paulus Sorbait 1682. Massia Pyralismum non improbat. Joh. Paschal. proteritum non fuisse, quia est naturae operatio. Angelus Bologninus fuisse movendum. Item Martiniol. 1515. Theodor. de Hery necessarium quandoque iudicat, cathartica frigidioribus interposita damnavit, non avetendum Mercurii efficaciam ab ore suader. Leonard. Botal. fritione. largas singulis diebus adhibet, donec gingivae intumescant. Georgius Dordon. de ulcerationibus oris non est folliculis. Ludovicus Sepalius 1614 etiam in imbecillis agrosicantibus, universâ quasi carne consumptâ, frequentiores inunctiones, ad spem apparitionem, verbo ad illis Pyralismum praescribit, neque movendum seculum nisi magnâ urgente necessitate. Hicronym. Monurus Pyralismum praedicat 1519. Esquidius sententia sunt Amatus Alcantar 1571. Per. Paul. Pereda 1579. Capivacius 1590. qui spem curacionis nullam esse, si statim à 72 fritione non corianur Pyralismum. Hiercul. Saxonia 1597. Andreas Castelpin 1602. Queretanus 1603. Eustach. kudius 1604. Epiphani. Ferdinandus 1611. Joh. Junkerus 1624. Turquetus de Mayenne 1650. Bernard. Christ. Capelle 1668. Sylv. de Boe 1670. Sydenham. 1680. Blancard. 1684. Joh. Fred. Ortolob 1674. Calmrite 1690. aliquae ferè omnes ejusdem, & sequent. seculi, scriptores & clinici procul dubio existim. inter quos numerandus clarissimus Adrianus Hicvetus 1710. vid. T. 2. Altr. dochil. qui insat omnium aurtorum esse potest.

(aa) Chilocon. obs. §. 9. (aa) Imo semper noxium, h. e. curacioni Lute Venereae officere, non dubitat asserere, quod non tantum proprium est, sed & majorum & equalium proxi oppositum.

(pp) Anonymus Anglus in eadem pag. dicit facultatem Monspellensem, in cancellatis opinionem infutrescille, (99) Willoughby, Douglass, & alique, quos ipse novi, non infirmè notam praedicat.

II.

LUTE Venereae morbus contagiosus, quo propagatur miasma corpori intronissum, humoribus & sanguini labem infert. Ubi subit vel vaporis specie, adherescit, nidularum, penetrat, circumambentium flui forum indolem immutat, suam impertit noxiam, virulentiam. Hinc multiplicata, aliis connubio guttulis jungitur, aliis associatur, alias generat sui similes. Gliscit tacite venenum, & pedetentim serpens, in sanguinem delarum, singula gradatim vasa pervadit, sin pulas vasorum ambages lustrat, novas ubique formas inducit, novas ubique tragedias peragit. Sic invalefcit morbus in dies, imas carpit medullas, totaque conaminat machinam, insicet, pculundat. Quo stadio, ne vel ultimam globulorum seriem, omnis contacti munimentum asserere, ratio non dissuadet. Hoc si undique subducas, vel in vasis delstrum, morbum tollis, unica supeltes particula renovabit, intender. Alterantia hinc, inde evacuantia percipis indicari. Uraque sed incassum in utrum vocabant antiquiores medici (a), quibus ignoto, vel damnato Mercurio, curatio methodica pro omni praesidio erat. Soli insistentum evacuationi, quae argenti vivi usus obrineatur, primus omnium, ni fallor, praecipit Angelus Bologninus (b), nec alium in finem à quovis ante annum 1718^m, adhibita reperies vel Mercurium vel Guayacum, nisi forte Petrum Monyardum (c), Petrum Bayrum (d) vel horum superiores (e), qui doloribus leniendis, pustulisve aut ulceribus sanandis, praemissa semper therapiæ methodica, inunctiones aptas altissimabant, volueris excipere. Variis tamen variis modis, educendam materiem morbosam censabant. Pyralismo ferè omnes (f), cathartici plures (g) utroque pauci (h). Hi sudores (i), illi perspirationem insensibilem (k), alii diuricum (l) cienda hortabantur. Neque

(a) Nicoit. Laonicen. 1497. Natal. Montefurur 1498. Bartholomaeus Montagnana 1499. Voets. 1507. Huerten. 1519. Laurent. Frius. 1531. Leonard. Fulchius. 1532. Langius. 1544. Fernel. 1556. Domin. Leo. 1563. Bernacq. Tomitanus 1563. Anton. Francancinus. 1564. Aurelius Minadous. 1596. Horatius Guarigianus. 1611. vid. Altr. T. 2. pag. 519.

(b) 1507. (c) 1518. (d) 1517. (e) Jac. Romers. 1498. Sebastian. Aquilan. 1498. Caspar. Torrell. 1497. Conradus. Gelin. 1497. (f) Vid. not. m. & leg. Tom. 2. Altr.

(g) Hic Georg. Dordon. 1568. quicunque frigidioribus cathartica interponebant, ut viderent Pyralismum, vel preparata intercurialia cathartica proponunt. Plures 210. Diagr. Jallap. Colochynth. hic Mercurio commendant. vid. Jacob. Cooke Medicum Anglum in *Melissio Chirurgia* Londini typis mandato 1693. pag. 229. & seqq.

(h) Overcamp cathartica Mercurio iungit. Turquetus de Mayenne 1660. Paulus de Sorbait 1680. Palmarius 1578. Hicetm. 1714. N. col. M. d. nec omnes materias per se curare... praescribit.

(i) (k) Inter metholos movendi sudores vel diaphoretici ope Guaiaci, 351. Chin. 352. 353. ab auctoribus praescriptas, quorum ingens numerus apud Altr. reperitur, ad primis seculi. 16 ad nostra usque tempora, alias 6 methodos egerit est apud. Cooke de Lute Venereae in *Melissio Chirurgia*. Saporata sudorem movere liminenta 1570 & qui Pyralismum improbant ferè cuncti, nec rament frigidioribus cathartica interponunt, perspiratione insensibili vel diuresi credunt morientem morbosam expurgari.

(m) Praecipit rub. post Vigorem nullum esse vid. Altr. T. 2. passim. vid. Zaeur. Lufuran. Prax. histor. 1.8. cap. 1. pag. 31. & seqq. Turper. nincial. in usu familiaris apud Anglos. Cooke ibid. Stribum praescribunt alii. Zaeur. ibid. (n) Antonius Bologninus.

defuere qui vomitu (m) Mercurialibus excitato, Luem Veneream curati affererent. Verùm quamvis lingulis hifce modis reftitutos fanitati non paucos concefferim, non idèo fanatos crediderim, quòd *feniam morbi, materiam antecedentem externi Mercurius effecit, corpusque à superfluitatibus mundavit* (n), fed quod vitium humorum correxerit, pravam difpofitionem alteraverit, venenum extiorcit, vel ut Trincavellii verbis utar, quòd malignam hanc Luem deleverit, & mutaverit illam interperaturam, quæ fomes eſt & fundamentum iſtus mali affeſtus. Etenim 1^o. Evacuancia quævis abſque Mercurio, Cathartica, Emetica, Sudorifica, Diaphoretica, Diuretica, Apophlegmatizantia parum efficacia eſſe, hodie apud omnes in conſeſſo eſt. 2^o. Non raro accidet morbum ſolvi virtute exſiccativâ liamenti . . . abſque ullo ſigno ſenſibili evacuationis (o) quin illius appareat fluxus materiæ ab ore, ullus fluxus ventris, aut aliquod ſignum evacuationis manifeſtè (p). 3^o. Ubi ægrotudo ingens eſt (q), vel inundanti debiliores, illuſiones ita miſtiltrat ſanior Medicorum pars, ut & Pyaliſmus & omnis excretio ſenſibilis vitentur (r). 4^o. Eandem felicitè methodum, in robuſtioribus expertus eſt illuſtriſſimas Archiatrorum comites. 5^o. & ſalvationem ad exterminandam Luem Veneream abſolutè neceſſariam non eſſe, ipſe doctiſſimus factur Alſtrucius (ſ), & experientiam omni ratione majorem, medicos jam pridem docuiſſe. Mercurium etiam dum nullam ſalvationem eiet, ceteroquæ tamen eoſdem effectus in ſanguine præſtare, ac ſi ſalvatio legitima motu foret, modo debitâ copiâ ad ſanguinem penetraverit, & prinde attenuatis liquiſſis, reſeratis vaſis, reſtitutus oſcillatorio partium motu, diſſegetur obſicibus, proſiſtigat ſemini morboſo, Luem Veneream radicibus perinde extirpare (t). 6^o. Cùm nullum morbo jam conſignato corporis punctum, nulluſve humorum globulus, virûs immunia dici valeant, evacuatione merbum penitus tollere, eſt morbi ſeminiû ſingulis inhærens punctis elicere, eſt ſingulos humorum globulos, quâ datâ portâ, expurgare, novuſque illibatos contaminatis ſubſtituere (u), ſinguli quippe globuli ſeminiû morboſum aut conſtituunt aut continent. Simul-taneam humorum expurgationem repugnare, nemo non videt. Succelliva ſingulis veneni partibus educendis impar eſt. Etenim quæ primæ evacuationi ſuperſeſſent fluida, eandem quæ pocant labem advenientibus inurerent, circulatione extenderent, calore foverent, multiplicarent, alerent. Quænam verò præciſe ſanguini nutrito, vel quo præciſe modo hæc à Mercurio induatur, quamvis abſcondita ſpecialis veneni natura determinare vetet, iterato antiodi in venenum impetu opus eſſe, Phyſica docet & Praxis medica confirmat. Omnis enim actio corporis motus eſt, & eo medici conſilio Mercuriali utuntur linimento, ut Hydragrgi particule canales ſubeant, & quaquaverſam raptæ, in Luem fluidis hoſpitantem incurrant. Hinc 1^o. Frictiones ſibi ſuccedunt à pedibus ad ſuperiora aſcendendo. Sic enim fluido primû venoſo, dein arterioſo repetitis vicibus optime miſcetur. 2^o. Si caput dolor vel gravitas occupet, faciem pulſile, ſcabies, herpes, ulcera, exoſtoſis, aliudve ſymptoma venerenum dehoneſcit, axillas huic repleat, pectori abdominive vel minimi morbi nota inſideat, frictionibus perinde (v) ac reliquæ partes ſubjiciuntur, ut morbi cauſa potentius inſinuetur. 3^o. Eò pars quælibet affecta ſæpius inungitur, quò ſymptoma quo laborat contumacius, & remedio magis reſiſtit. Sic exoſtoſis tibiſe inſignem diebus à frictione liberis, quindecies illinire contigit. Sic alteram, quæ frictionibus ritè celebratis nullatenus ceſſaret, frictione decies repetita oppugnare, necelle habui. Poſt quantam frictionem, trifariam partita, ſenſim decrevit indies, tandemque poſt decimam omninò evanuit. 4^o. Si pars affecta, fauces vel interiora ſitis ulcerata, propter ſitum, humiditatem, alianve quamvis rationem, illitioni minus apta ſit, ſoluto frequenter madeſcit Hydragrgi aſſolet, quo latens contagium citius & expeditius debelleretur. 5^o. In affectionibus quibuſdam localibus (xv), tumoribus, exoſtoſibus, herpete, præter unguenta utimur nonnunquam emplaſtro Vigonis, aliquando & ſuſſitu (x), ut morbi vires citius frangantur. Cura igitur morbi poſtulat, ut remedium ſingulos corporis ductus percurrat, ſingula corporis puncta attingat, ſingulis humorum globulis occurrat, ſingulas virûs particulas ſæpius impetat. Ergò 1^o. ſi vel minimam corporis partem relinquit inſalutatam, cura imperfecta futura eſt. 2^o. Si vel anicum in ductu quovis globulum, præſertim inquinatum non attingat, cura imperfecta futura eſt. 3^o. Si vel unica virûs particula non occurrat ſæpius, cura imperfecta futura eſt. 4^o. Si minor Hydragrgi quantitas ſanguinem penetret, vel quæ penetrat, minus diu ſanguini mixta maneat, quam ut dictis conditionibus ſatiſfaciat, cura imperfecta futura eſt.

(d) Id. (b) Nicol. Maſſ. l. 4. c. 2. (g) Geor. Dord.

(h) Chiconæus diſſert. laudatâ, vid. not. mm. poſitionis primæ. (i) pag. 231. (t) pag. 216. hinc ſequentiâ deli-
duco, 1^o. Evacuatio ut evacuato curando huic affectui non ſufficit. 2^o. Solvitur Luem Venerea quin ulla excreto-
evacuatio. 3^o. Singularis illa ſpecifica operatio quæ morbus hunc curat, non eſt evacuatio. 4^o. Singularis illa ſpeci-
fici operatio eſt alteratio. 5^o. Hydragrgium ſanât Luem Veneream, alterationem humoris aliquam & partibus
ſerimis inducendo, attenuando, aperiendo, ſtimulando, diluendo, miſcendo, diſſolvendo.

(u) Novi Medicum qui curam Luem Venereæ ſic aggreſſus eſt, in initio ſanguinem mitteret bis quolibet ſeptima-
na, dein ter, hinc ſexies, poſtea quolibet die, tandem bis ſingulis diebus, donec veterem, aiebat, malam co-
nam extraxiſſet, novam ſubſtituiſſet.

(v) Leonvd. Borſi. Coll. Luſan. Lugd. Batav. pag. 88. & Traſſavol. ibid. pag. 69.

(x) Id. ibid. (x) Rondelet. ibid. pag. 951. Nicol. Michell. ibid. 714. 7, 16.

PTYALISMUM tertie, ut plurimum inunctioni supervenite norunt Chirurgi; deficere tamen aliquando post decimam, plures testantur. *Ultra septem vices inquit* Capivacius non illinendus ager, *quia si non exposit in septem vicibus, nulla spes, quatuor decies sine periculo posse adhiberi inunctiones*, asserit Valinerius. 1697. Ubi primum dentes dolere incipiunt, vel plegmatica per gingivas notabiliter dissolvi, vel superfusitates peccantes alia regione evacuari tunc ab illiusque desquendum (a), quod 3^a, 5^a, 6^a, 9^a vel 10^a die plerumque accidit. Ludovicus Sepetalus post snum apparitionem, iterandam semel aut bis inunctionem monet (b), alii preparata jubent mercurialia interius fumantur (c), ut motum lentè spiritum excitetur (d), & producant salivato. Adeoque quæ in hac methodo impenditur Mercurii quantitas, fere tres, aliquando sex vel octo, ad summum duodecim drachmas non excedit. Quamvis autem Mercurius in minutissimas guttulas divisibilis sit; fidem tamen omnem superare videtur, numerum particularum in quas vi vitæ quantitas illa Mercurii dividitur, adæquare numerum canalicum, quibus corpus humanum coalescit, in innumeras decrefcentium series ubique abeuntium, in innumeros ubique orbes, vel innumeras ubique plicas convolutorum. Canalicum numero adde numerum guttularum indefinitè parvarum fluidi, quæ in singulis volvuntur. Numero guttularum Mercurii detrahe 1^o. Numerum particularum, quæ manus vel chirothecas illinentis servi penetrant; aut ipsis adherent. 2^o. Numerum guttularum quæ lineaminibus ægri ab orbentur. 3^o. Numerum guttularum quæ cuti vel pilorum bulbis hærent infixæ, aut inde repelluntur. 4^o. Numerum particularum, quæ inter inungendum quoecunque alio modo amittuntur. Paucissimas sanguinem penetrare fateberis, neque singulis humorum globulis occursuras, facillis credes. Sed ut rem paulò altius scrutemur. Supponamus 1^o. duodecim drachmas Hydrargiri, partitis duodecim vicibus, intra duodecim dies, fricatione ad siccitatem productâ cuti inunctas. 2^o. Detractiones jam memoratas duarum solummodò drachmarum esse. Demus 3^o. reliquis decem drachmas vasis admittas. Ast ne vel harum quinque, humoribus diu savis immixtæ, circulationis legibus obsequuntur, vel juxta capacitates valorum distribuantur. 1^o. Scilicet, cum excretorii ductus, arteriarum sine ubique propagines, qui in aortam quilibet cordis systole impellitur, Mercurium excutendis consulum indefinenter educi, & quantitate immitti sequitur, eoque majorem jacturam esse, quo circuitu humorum, repetitis illitionibus adaucto, sanguis ad organa secretoria velocius appellat. 2^o. Ubi oris aggravo invalescit, gingivæ mollescent, & salivales glandulæ tumescere incipiunt, (quod 5^a, 6^a, vel 8^a die supponamus evenire) Mercurii huc suapte quasi naturâ affluentis (e) copia augetur, in reliquo corpore minuenda. Spuratione dein allicitur (f); dilatatis glandularum vasis admittitur; apertis, laceratis excretoriis elabitur & profluit salivæ commixtus, eò uberius quo Ptyalismus largior est, & oris ulcera plura sunt atque majora. Nonne timendum ne totus quantus est effugiat, antequam virus ubique latens destruat, nonne timendum ne partes aliquæ illius præsidio omnino destituantur? Suum pariter obseculum afferunt diarrhæa, sudores profusi, urinæ profluvium, hæmorrhagiæ inunctionibus inducta. Horum ultimum exteris minus frequens, morbo parum debellato, videre aliquoties contigit ab ore, naribus, pudendis, hæmorrhoidibus (g).

(a) Angelus Bolegninus. Jacobi Casaneus. Joh. de Vigo. Méth. Borall. Dordon. &c.

(b) Caution. melie. de morbo Gallico. (c) communis chirurg. Anglorum praxi. (d) Vid. Septal. itid.

(e) Quod illius mobilitas & parium figuræ, structuræ mechanice Aortæ & Carotidum oritur, tribuendum potest. (f) Argemum vivum in defunctorum capitibus in sepulchris repertum, memorat Brissavol. de curâ M. G. Coll. Lunian. pag. 692. defuncti salivationis tempore caput, examini anatomico subiectum, Hydrargirium copiosum edidit, quo repleta quasi videbatur diploe, ossa sphenoides, ethmoides, vomer, nasi, & palati, & sinus omnes.

Ino exteriori cranio secretum quasi ubique hæretat, observatum plures inter quos numerandus præfens illustrissimus. Alexand. Traj. Person. Mercurium in capitibus inunctorum reperti, cum sudore exire, arinis supernare, in maculis colligi asserit, & ab eo tuum d'albari. Ipse magnam Mercurii quantitatem in maculis lævis inventi.

(g) Idem intelligendum velim de purgatione frictionibus interpositâ.

IV.

ÆGRUM luc Veneræ affectum, inungendum ita curavi, ut singulis diebus, linimentis et ex aurungæ & Mercurii analitæ partibus compositi, duæ drachmæ adhiberentur. Mox post sextam frictionem Ptyalismo, qui ad trigessimam sextam diem productus est, ab inunctionibus cessatum, & servatis anno integro, quæ primis quatuor salivationis diebus fluxerant, sexdecim salivæ libris, septuaginta duo Hydrargiri grana, in fundo vasis reposita sunt. Si elabentis ore Mercurii quantitas, eadem quilibet die supponatur, ne vel unicum vigesimæ die granum, corpori reliquum inerat. Si deperditionem positione superiori expositam (a), drachmæ æqualem dederis, hora decimâ-septimâ post sexdecim dies, nulla supererat Mercurii guttula. Si amissam reliquis secretionibus quantitatem, quantitatè ore effusa, unam tertiam judicaveris, ultra dies duodecim, cum quinque horis & vînginti minutis, nil Mercurii superavit. Si tan-

(a) No. 1. 2. 3. 4.

dem à prima inunctione ad motam salivationem, omnibus secretionibus drachmam semissem concederis, horà post septimam diem duodecimà, Mercurio planè expurgatum erit corpus. Quod temporis spatium brevius existimaverim, quàm ut in eo, dicta Hydragri quantitas, quæ singulis instantibus minuebatur, conditionibus supra stabilitis possit satisfacere. Si diutius humoribus mixtum inhaesit Mercurium dixeris, alt ita inæqualiter distributum non negabis, ut partes quasdam nunquam attingerit. Dato, post septem dies cum medio, Mercurium totum eliminatum esse, concedendum pariter erit, plus Mercurii quilibet cordis systole, admissum esse ab aorta ascendente, quàm à descendente; imò maximam huiusce portionis (aortam ascendente ingressæ) partem, per catodes externas revolutam, quin minores forsàn quasdam, ejusdem trunci lobos, ulla subierit molecula. Si penultimam admissis suppositionem, minorem adhuc Mercurii quantitatem, aortæ descendenti concedes. Si antepenultimam, ne vel guttulam dabis. Si Mercurii unà cum salivâ profuentis jacturam, gradatim à quartâ salivationis die minutam supposeris, adeoque nec tam citò corpore excludum, nec adeo paucum aortam descendente ingressum, ac allatæ suppositiones intelligendum præbent, nonne saltem totum opinionem citius effluxisse fateberis? nonne suspicaberis partes aliquas ab illo intactas fuisse auctâ unâ secretionem, cæteræ omnes imminuuntur, & dum uberiori saliva fluxu, in os undique confluit, scrolo laice partes reliquæ depauperantur. Quidni & particularum Mercurii pyralisimum producentis, os & fauces exulcerantis, ratio alibi deceleat? Non aliam posse reddi rationem recidivæ putaverim, ubi cura, per decem à tractatione jam expositâ menses, radicalis visâ est.

Cùm dubius adhuc de Pyralismi commodis & incommodis hærerem, sequentia subie experientia instruit. Sanum hominem drachmis sex unguenti, ex una Mercurii & duabus arundinis partibus compositi, eo inunxi animo, ut salivationem cercim. Spuratione tertiâ die exortâ, secundam iltionem eadem unguenti quantitate, non ante diem quintam celebravi. Ecce protinus invalescens salivæ fluxus, copiosus admodum factus est die septimâ. Vesperî nummum aureum per quindecim minuta ore retinendum curavi. Nitor parùm offuscatus, & inultæ alteri lateri notæ quatuor albicantes, Mercurii in os appu sum denotarunt. Excitato die nonâ sudore largo, bacillum capitulo ornatum auro, manu comprehendere jussi. Post sex horam, aurum conspurcatum, Hydragrio maculatum est. Misso die decimâ sanguine, & subductâ postriede alvo, die decimâ-sextâ, subsistente Pyralismo notabili, qui ad vigesimam-quintam inclusivè diem productus est, nummus aureus vasi, in quod illius expuebar, immisus, per Hydragri salivâ coopertus permanfit, quin tamen ullam coloris mutationem passus fit, ul lamve Mercurii notam contraxerit. Die decimâ-octavâ absterfis unguenti reliquis, loctique probè partibus inunctis, eundem nummum aureum uni applicui, & fasciâ ligavi, ut immotus loco per noctem detineretur. Nulla Mercurii vestigia mane observata sunt.

Pyralismo febris ut plurimum jungitur, motus humorum valde turbatur, sanguis rarefit, lymphatica quadam premit, humoris contenti cursum sistit. Mirumne hac turbâ Mercurium inæqualiter distribui, alia multum, alia paucum, alia nullum vascula ingredi? Si lymphaticum conspersum à sanguifero oriatum, quod Mercurius non subierat, tota fluidi ab arteriâ sanguiferâ, ad partem obstructam columna, viru infecta permanet. Et, si eætenus secretio quævis augeatur, ut Mercurius è corpore totus, vel plurimum amandetur, antequam tollatur obstructio, reliquam citò massam vitabit. Vas compellum gratis supponi respondebis. Esto, humorum nonnulli plures iusumunt dies, ut ad cor revehantur. Si horum secretoria à sanguiferis soboleant, quæ Mercurius non salutaverat, curam imperfectam, mancam, recidivam certò futuram non inficiaberis.

Denique si recidivam idè futuram prævideas, quod Mercurius vasa, ductus, glandulas cuncta non pervadat; quid sperandum arbitraturs es, eum virus Venereum hic, illic, ubique humoribus altè infusum, non nisi repetitis globulorum Mercurii percussioibus delendum, in mentem revocaveris?

V.

NE nudo rationum & quorundam experimentorum apparatu, quam fumus illarum conclusio inniti videatur, consentientem juvat ipsam proximè medicam, ipsam experientiam in partes trahere, & maneat post longæ salivationis tædia, molestias, incommoda, pericula, curarum, quæ occurrerunt, nonnullas subijcere, quibus dicta muniantur, roborentur, confirmentur.

1°. (a) Quem primum suscepi Parisiis curandum, nobilis juvenis, viginti quinque circiter annos natus, vegro robustoque corporis habitu præditus, gonorrhœa à terdecim jam mensibus diverabatur. Huic supervenire ulcera balani majuscula, porri, verruæ, lumbago, dolor capitis assiduus, corona Veneris, & ulcera duo in faucibus conspicua. Quamvis methodum Monsipellanam felicè sæpius eventum Monsipelli expertus fuisset, ægrum Pyralismi methodo trac-

randum judicavi, tum quòd alteram Parisiis usu nondùm receptam, à medicis damnatam, & ab ipsis Montpellierensibus in hac urbe non usitatam accepim; tum quòd aeterni hinc humaniorem frigidiorque illi methodo officere ipse crederem. Ager sexies inunctus, omni agitudine curatus, post decem menses relapsus est. Tentatà dem curatione methodo Montpellierensia, duodecim adhibui drachmas Mercurii. Sed vanà pro dolor spe! novam post sex menses petecipi recidivam. Ager tamen tertio tentamine, sanitati restitutus est methodo Montpellierensia, adhibitis, quinquaginta dieum intervallo, uncis duabus cum semisse Mercurii, sine ulla sputationis vel alterius adauctæ evacuationis indicio.

(b) 2^a. Nobilis femina quadraginta quinque annos nata, ulcere pudendi lato profundoque, cum fissura linguae ulceroſa laborabat. Hæc (floris albi soboles aiebat ægra) ita augebantur in dies, ut unanimi medicorum & chirurgorum consilio, Mercuriali unguento, juxta consuetum patris ritum, sine morâ uncta esset. Post Pyralisimum diuturnum, gravissimum, uberrimum, integram viam est sanitatem recuperasse. Ecce tamen tertio à curatione mense, recrudescens pudendi ulcus, Lucem penitus exterminatam non esse ostendit. Non multò post recruduit & ulcus linguae. Convocatis de novo medicis chirurgisque, statutum est ut novum subiret inunctionem Mercurialium tentamen. Quod dictum factum, Inuncta est, sputo maduit fordescens, convalluit, recidit, Nec felicitè tertio tentamini eventus. Invalescere dein morbus cœpit, squallere corpus ulceribus, doloribus actum, noctu præsertim fœventibus ægra cruciari. Hinc restitit patris laribus, in Galliam confugit, quali Lucem omnibus medicorum & chirurgorum patris conatibus major esset. Celebrata Parisiis frictions Mercuriales, motus Pyralisimus, & in septuagesimam octavam vel nonam diem productus, deterſa, consolidata ulcera, sedati dolores, cunctaque in vado esse visa sunt. Ægra rus abiit convalluita. Lactis ac diæte usu per sex menses integros se se optimè habuit. Exinde vero dolores reviviscere, ulcera aperiri, grandæſcere, cavari, & in ambitu nigrescere, partes vicinas inflammari, omnia verbo in pejor ruere. Nostram ægra opem petiit, & octoginta dierum spatio prorsus sanata est, nullâ per totum tractationis decursum adauctâ, quod sciam, secretionem.

3^a. (c) Circa idem tempus nostræ commissus est curæ nobilis alter, symptomatis haudquam æquivocus morbi venerici affectus. Hic sumptis absque emolumento centum *Misobolæis*, (d) pilulis, inunctiones, qua potuit fieri arte, juxta consuetam Pyralisini methodum passus, optimâ per duos menses valitudine usus est. Recrudescente morbo, Luteriam se contulit, & quadraginta dierum intervallo, quin ulla intenderetur secretio, convalluit.

4^a. (e) Anno 1735 ægrum inviti ulcere, musculis pone velum palatinum positis afflictum, unde pus dimanans velum perforaverat. Haic natales dedit gonorrhœa Lugduni Batavorum aliquot ante annos contracta. Inunctus primâ vice Londini, curante Medico celebri, æger longæ salvationis tædia patienter tulit, & debellato quasi morbo, convalescere visus est. Apparete post sex septimanas ulcere, plurima in usum vocata sunt remedia, quibus incallum æger per anni curriculum usus est. Luteriam venit, inunctus septuaginta quinque libras salivæ extrivit, & emaciatus omni symptomate venerico liberatus per tres septimanas creditus est. Appertum tendit ulcus, deoſto Sudorifico, pilulis, soluto spiritu nitri Mercurio, aliisque remediis mundatum, exsiccatum est. Recruduit tamen post mensem. Sed eptis bimèstri spatio, aquis mineralibus, de *Passy*, eatenus evanuit, ut æger in patriam remigrare non dubitaverit. Navi se crediturus, de ulcere iterum aperto certior factus est. Luteriam repetiit, & nostræ commissus curæ, intra dies quinquaginta duos, integræ sanitati restitutus est. A decimâ ad decimam-septimam diem, levis mora sputatio, exinde vero nullum observatum evacuationis adancæ signum, quamvis illutiones ad quadagesimam usque nonam diem, aliquando singulis, aliquando alternis, nonnunquam quidem tertio vel quarto quoque die administrarentur.

5^a. (f) Pleuriticus sanatus de superstitibus Luis Veneræ symptomatibus conquerabatur, dolore lateris punctorio, & Rheumate interdum recurrentibus, ipsâ quam curaveram, pleuritide, sed imprimis pruritu periodico calcis alterius, sub noctem semper sevientem. His scilicet sepius à quatuor annis laboraverat, à Pyralisino nempe, quem, Luc Veneræ inquinatus diuturno, passus est. Inunctiones Mercuriales eburnis efflagitantem irriti, iramini tandem inungendum curavi, à dictis symptomatibus, quæ Luis Veneræ tribuenda non crederetam, liberavi. Pruritus quidem citò recidivus, convalescentem per mensem vexabat, exinde verò cum cæteris symptomatibus omnino evanuit. Excretiones omnes consuetam naturæ legem sequi visæ sunt.

6^a. (g) Sub finem ejusdem anni centurio nocturnis artuum doloribus, balani ulcusculis, & frequenti vertigine laborans, curandum se se nobis tradidit. Symptomata hæc recidiva affirmavit, neque ullum se cum femina quavis, à duobus annis commercium habuisse, quò præcisè tempore inunctionibus Mercurialibus submissis, salivationem ad quadagesimum quatuor diem productam passus est. Absoluta diebus triginta tribus curatio, quin ulla excretio manifesta ad diem usque vigesimum quintum moveretur. Tunc enim evanescente, qui temporis sinistro insi-

debat tumore, ulcus in interiori ejusdem lateris genâ enatum, humore purulento ad integram tumoris subidentiam madere non cessavit.

7^o. (...) Mercator nostrâ traditus curâ sequentibus affligebatur malis. 1^o. Asper admodum, spissus, fœcidusque herpes capitis partem capillatam occupabat, unde stillans humor acerrimus tempora, aures, frontem exedebat. 2^o. Maxillâ inferiori dextræ, exostosis adnata notabilis prominebat. 3^o. Glans penis dextrâ parte schirrosa quasi, corpus cavernosum ejusdem lateris induratum erat. 4^o. inguinum & axillarum glandulæ tumefactæ bubones æmulabantur. 5^o. præputium inter & glandem, duæ numerabantur verrucæ insignes, 6^o. frequentes per habitum corporis observabantur furunculi. 7^o. quatuor faucibus ulcera insidebant. 8^o. dolores artuum nocturni ægrum molestant. 9^o. ipse macie propemodum consumptus, colicâ statim à præparantibus bis laboravit, cui anodyna & frictions duæ mederi visæ sunt. Morbus hic gonorrhœæ diligenter tractatæ progenies. Aget illitionibus haud morâ submissis, largo salivæ profusio curatus videbatur. Quatrâ post Pyralismum die, recidivæ penis indurationi, cancer adjunctus est, & faucium ulcera recruduere. Mercuriali unguento more patrio iterum invinctus, salivatione bimestri emaciatus, non sanatus est.

Quatuor cum semisse uncias Mercurii huic ægro administravi, morbumque ante finitos sex menses radicis extirpavi, minime incommodo, nullâ secretionem adauctâ, nulla somni vel tranquillitatis jacturâ.

Ex dictis sequitur.

(¹) 1736.

1^o. Perseverare sæpius Pyralismum, Mercurio penitus expurgato.

2^o. Pyralismum non esse necessarium ad curandam Lucem Vherream.

3^o. Esse omnino inutilem.

4^o. Esse in causâ, cur Mercurius minus benè distribuatur etiam in ore & faucibus.

5^o. Esse in causâ cur Mercurius citius à corpore amandetur & effluat, quàm par est.

6^o. Esse in causâ, cur minor Mercurii quantitas quàm par est, in sanguinem transfundatur.

7^o. Esse in causâ cur partes aliquæ remediis præsidio priventur.

8^o. Hinc esse impedimento sanationi.

9^o. Catartica frictionibus non esse interponenda, propter easdem rationes.

10^o. Omnem evacuationem nimiam, vel frequentiore sanationi Loris Veneræ adversari.

11^o. Ergo Pyralismus frictionibus Mercurialibus provocatus, perfecte Loris Veneræ sanationi adversatur.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Joannes-Baptista-Ludovicus
Chomel, Medicus Regis ordinarius.

M. Antonius Casamejor,

M. Joannes-Franciscus Gouthier,

M. Hyacinthus - Theodorus
Bayon,

M. Raymundus de la Rivière.

M. Joannes Baptista Mongin,
Medicus Regis ordinarius.

M. Ludovicus - Maria Pouffe.

M. Franciscus - Josephus
Hunault, Regiæ Scien-
tiarum Academiæ & Regiæ
Societatis Londinensis Socius,
in horto Regio Anatomæ &
Chirurgiæ Professor ac de-
monstrator.

M. Michaël Procope Couvreur,
Scholarum Professor.

Proponebat Parisiis ANDRÆAS CANTWEL, Hybernus, Doctor Medicus Montpelien-
sis, Societatis Regiæ Londinensis Socius, legationis Anglicanæ Medicus ordinarius,
Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, A. R. S. H. 1741. à sexta ad meridiem,